## TESTUDO AREOLATA, *Thunberg.*

Mandibulâ superiori acutè uncinatâ, denticulatâ; squamâ gibbosâ frontali; testâ oblongâ subconvexâ, margine revoluto; scutis sulco profundo separatis, areolis depressis.

*La Vermillon.* Lacép. Quad. Ovip. 166.
*Testudo areolata.* Thunb. Nov. Act. Suec. VIII. p. 180.—Schœpff, Test. t. XXIII. p. 104.—Latr. Hist. Nat. Rept. I. p. 157.—Shaw, Gen. Zool. III. p. 50.—Daud. Rept. II. p. 287.—Schweig. Prod. in Konigsb. Archiv. sp. 4.—Merr. Amph. p. 30.—Gray, Syn. Rept. p. 13.
*T. pusilla.* Daud. Rept. II. p. 299. (neque Linn. nec Schneid.)
Var. scutis marginalibus XXVII.
*Testudo Cafra.* Daud. Rept. II. p. 291.
*T. fasciata* ejusd. p. 294.—Merr. Amph. p. 29.

Habitat in Africâ australi, et in Insulâ Madagascar.
Mus. nostr.—Mus. Brit. &c.,

Descriptio. *Caput* magnum, gibbosum, squamosum, fusco-viridescens, squamâ magnâ, corneâ, gibbosâ, rubescente supra nasum. *Mandibulæ* pallidè viridescentes, denticulatæ; *superior* acutè uncinata. *Collum* viridi-fuscum, squamis minutis tectum. *Pedes anteriores* viridescentes, squamis elongatis, lanceolatis, imbricatis, anticè defensi: *posteriores* squamosi. *Ungues* longiores graciles, fusci. *Cauda* crassa, conica, obtusa. *Testa* subconvexa, oblonga, margine revoluto. *Scuta dorsalia* omnia elevata, sulcata, sulco profundo separata, areolis centralibus, depressis, punctatis; color scutorum viridi-flavescens, margine et disco badiis vel fuscis: *vertebralia* elevata, disco truncato-plana, areolis depressis, punctatis, medio carinatis; primum pentagonum, lateribus parallelis; secundum subpentagono-quadratum; tertium quadratum; quartum cuneiforme, posticè truncatum; quintum irregulariter rhomboideum, subverticale: *costalia* declivia; primum latum, anticè productum; secundum et tertium